

Palpation ved udredning – dele af Jacob Liebermanns* protokol

Navn: _____ Cpr. nr.: _____ - _____ Logopæd: _____

Grebene tages fra siden med hoved, nakke/hals og skuldre i neutral position.

Der registreres ømhed, evt. placering og spænding i hvile og ved fonation

Område	Aktivitet	Grad 0	Grad 1	Grad 2	Grad 3	Ømhed (andet)
Submentalt område Palper med langefinger – evt. flere steder i området	Hvile	Blødt	Blødt	Nogen spænding	Konstant spændt, maksimalt ved fonation	
	Kontraktion under fonation: 1) Forholdsvis dybt: /a/ (arne) 2) Høj tonehøjde: /u/	En smule kontraktion	/a/: let /u/: moderat	Spændt og fremskudt kæbe		
Thyreohyoide område Palpér bilateralt med pege- og tommelfinger	Hvile	Ingen kontraktion	Blødt område	Spændt og snævert område	Meget spændt	
	Kontraktion under: 1) Tale: tæl 1-5 2) Let nynnen /mmmm/	Mild kontraktion	Nogen kontraktion	Moderat kontraktion	Konstant lukket	
Afstand mellem cartilago cricoidea og thyreoidea Palpér med spidsen af pegefingrer	Placering af cartilago cricoidea i forhold til cartilago thyreoidea	Normal	Normal	Anterior forskydning af cartilago cricoidea	<i>Anterior forskydning af cartilago cricoidea</i>	
	Åbningsgrad i hvile		Indsnævret	Indsnævret	Konstant lukket	
	Lukning og åbning ved: 1) Forholdsvis dybt: /a/ (arne) 2) Høj tonehøjde: /u/ - evt. glidetone		Nogen bevægelse	Lukning		

*Angsuwarangsee T, Morrison M. Extrinsic Laryngeal Muscular Tension in Patients with Voice Disorders. Journal of Voice; 16(3): 333-343. 2002.

Udkast til palpationsprotokol jf. dele af Liebermanns protokol december 2010. Solveig Gunvor Pedersen. CSU Roskilde.